

Aandoening

Bloedverlies in de eerste 12 weken van de zwangerschap

Bloedverlies in de eerste twaalf weken van de zwangerschap is vaak onschuldig en gaat vanzelf voorbij.

Het bloedverlies kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het bijvoorbeeld het gevolg zijn van het innestelen van het eitje of een wondje aan de baarmoedermond. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals een miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Bent u ongerust? Neem dan contact op met uw verloskundige of behandelend gynaecoloog.

Meer informatie? Kijk op Degynaecoloog.nl. (<https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/bloedverlies-aan-begin-zwangerschap/>)

Onderzoeken

Bij bloedverlies in de eerste twaalf weken van de zwangerschap, maakt de gynaecoloog altijd een inwendige echo.

Met deze echo kan de gynaecoloog zien of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of het hartje van de baby klopt. Bent u nog geen zes weken zwanger? Dan kan de diagnose vaak nog niet met zekerheid gesteld worden. Daarom kan het nodig zijn om na een week nog een keer een echo te maken.

Behandelingen

Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de oorzaak van het bloedverlies. Uw gynaecoloog spreekt met u door wat u het beste kunt doen.

Poliklinieken en afdelingen

Gynaecologie en Verloskunde

Het specialisme Gynaecologie en Verloskunde houdt zich bezig met de medische zorg voor de vrouw in al haar levensfasen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/gynaecologie-en-verloskunde>

Code GYN-776