

Aandoening

# Bloedverlies na de eerste 12 weken van de zwangerschap

Bloedverlies na de eerste 12 weken van de zwangerschap, is altijd een reden om uw verloskundige te bellen. Of als u bij de gynaecoloog onder behandeling bent, om het ziekenhuis te bellen.

Vaak is dit bloedverlies onschuldig; vooral als het optreedt na het vrijen of na harde ontlasting. De buitenkant van de baarmoedermond kan dan gemakkelijk wat bloeden. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals:

- dreigende vroeggeboorte;
- laagliggende moederkoek (placenta);
- andere (soms ernstige) problemen met de moederkoek.

## Onderzoeken

Bij bloedverlies na de eerste twaalf weken van de zwangerschap maakt de gynaecoloog meestal een uitwendige en inwendige echo.

Met een echo controleert de gynaecoloog de lengte van de baarmoedermond en de ligging van de moederkoek (placenta). Als u meer dan circa 26 weken zwanger bent, maken we ook een CTG (hartfilmpje) van de baby. Het kan nodig zijn u ter observatie in het ziekenhuis op te nemen.

## CTG-onderzoek

Een CTG is een hartfilmpje van uw ongeboren kindje.

Met een CTG wordt het kloppen van het hart van uw kindje geregistreerd. Ook kunnen we zien of u weeënactiviteit heeft. Een CTG kunnen we maken tijdens de zwangerschap of bevalling.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/ctg-onderzoek>

## Behandelingen

Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de oorzaak van het bloedverlies. Uw gynaecoloog spreekt met u door wat u het beste kunt doen.

# Poliklinieken en afdelingen

## Gynaecologie en Verloskunde

Het specialisme Gynaecologie en Verloskunde houdt zich bezig met de medische zorg voor de vrouw in al haar levensfasen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/gynaecologie-en-verloskunde>

Code GYN-780