

Aandoening

# Kloofje in de anus (fissura ani)

Een kloofje in de anus zit op de middellijn aan de voor- of achterkant van de anus. Een kloofje loopt altijd in de lengterichting.

Een kloofje in de anus geeft meestal klachten als een scherpe pijn tijdens of na de stoelgang, vaak met wat bloedverlies. Waarom het kloofje ontstaat en waarom juist op bepaalde voorkeursplaatsen in de anus, is nog niet precies duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een verhoogde spanning, een soort kramp van een deel van de kringspier en daardoor een verstoorde bloedvoorziening.

## Onderzoeken

Meestal zijn de klachten zo duidelijk, dat alleen een lichamelijk onderzoek nodig is om de diagnose te stellen.

Bij dit onderzoek zal de arts de anus inspecteren en zal hij de anus wat moeten spreiden om het kloofje te kunnen ontdekken.

## Behandelingen

Meestal reageert een kloofje in de anus op eenvoudige maatregelen.

In de eerste plaats zal de ontlasting zacht gehouden moeten worden. Daarvoor is het eten van voldoende plantaardige vezels (zemelen, bruinbrood) en het drinken van veel water (zo'n anderhalve liter extra per dag) nodig. Om de ontlasting zacht te houden kan de arts u ook medicijnen voorschrijven, bijvoorbeeld poeders van plantaardige vezels of een drankje.

Een kloofje in de anus wordt meestal als eerste behandeld met een bloedvatverwijdende crème, die regelmatig in de rand van de anus moet worden aangebracht. Als bijwerking van deze crème is bekend dat het bij 10% van de gebruikers branderige gevoelens geeft. In die situatie zal een andere crème worden voorgeschreven. De crème moet ongeveer drie maanden worden gebruikt voordat het definitieve resultaat kan worden beoordeeld.

Heeft de crème te weinig resultaat, dan kunnen we ook Botox spuiten. Als het kloofje toch blijft bestaan, is een operatie ook een optie.

## Botoxbehandeling bij een kloofje in de anus

Wanneer u een kloofje in de anus heeft, kan de arts met u afspreken botuline toxine (in de volksmond: botox) in te spuiten.

Door de botox verwijderen de bloedvaten in het laatste deel van de kringspieren en verslapt het laatste gedeelte van de kringspieren. De spierdruk vermindert en de doorbloeding kan verbeteren. Het spuiten van botox gebeurt op de polikliniek. U krijgt links en rechts van de anus een spuit met botox.

Een kloofje in de anus (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aandoeningen/kloofje-in-de-anus-fissura-ani>) verloopt in de lengterichting en bevindt zich op de middellijn aan de voor- of achterkant van de anus. Het geeft meestal klachten als een scherpe pijn tijdens of na de stoelgang, vaak met wat bloedverlies. Waarom het kloofje ontstaat en waarom juist op bepaalde voorkeursplaatsen in de anus, is nog niet precies duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een verhoogde spanning, een soort kramp van een deel van de

kringspier en daardoor een verstoorde bloedvoorziening. Onbewust wordt door de pijn en de verhoogde spanning van een deel van de sluitspier de ontlasting opgehouden. Dat heeft tot gevolg dat de ontlasting hard wordt. Bij iedere stoelgang scheurt het kloofje steeds weer open en het blijft op die manier hardnekkig bestaan.

Meestal zijn de klachten zo duidelijk, dat alleen een lichamelijk onderzoek nodig is om de diagnose te stellen. Bij dit onderzoek zal de arts de anus inspecteren en zal hij de anus wat moeten spreiden om het kloofje te kunnen ontdekken.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/botoxbehandeling-bij-een-kloofje-in-de-anus>

## Operatie bij een kloofje in de anus

Heeft u een kloofje in de anus en helpt de behandeling met een crème of botox onvoldoende? Dan kan een operatie verlichting geven.

Met een operatie verminderen we de verhoogde spanning in een deel van de sluitspier. Dat gebeurt met een laterale interne sfincterotomie (LIS). Hierbij wordt via een klein operatiewondje naast de anus het uiteinde van de sluitspier ingeknipt. Het operatiewondje wordt open gelaten om het risico van infectie zo klein mogelijk te houden.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-bij-een-kloofje-in-de-anus>

## Poliklinieken en afdelingen

### Chirurgie

Een chirurg behandelt verwondingen, tumoren en infecties door het uitvoeren van operaties.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie>

### GE-chirurgie

Gastro-enterologische chirurgie richt zich op operaties in de buikholte, zoals operaties aan de dikke darm, alveesklier, lever of galblaas.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/ge-chirurgie>

Code CHI-010a