

Aandoening

# Open been (ulcus cruris)

Een 'ulcus cruris' is een wond aan het (onder)been die niet wil genezen. Dit heet ook wel een 'open been'. Een open been wordt meestal veroorzaakt door problemen in de aders van de benen. Soms zijn er meerdere oorzaken voor een open been of komt het door een andere aandoening.

Meestal hebben mensen met een open been spataderen en vochtophopingen in de benen. Dit gaat gepaard met een moe en zwaar gevoel in de benen. Er kunnen daarna bruine verkleuringen en eczeem ontstaan, soms met verhardingen onder de huid. Door een kleine beschadiging van de huid – of spontaan – kan een zweer of wond ontstaan. Een open been ontstaat over het algemeen rond of boven de enkels.

U loopt een groter risico op een open been bij:

- diabetes;
- te hoge bloeddruk;
- weinig lichaamsbeweging (immobiliteit);
- vaak en lang stilstaan;
- spataderen.

## Onderzoeken

### Duplexonderzoek

Een duplexonderzoek is een onderzoek van de bloedvaten, bijvoorbeeld in de hals, buik, benen en armen.

De vaatlaborant brengt met geluidsgolven (echo) uw bloedvat in beeld. Ook meten we de bloeddorstroming (doppler) in uw bloedvaten, zowel de snelheid en de richting. Zo kunnen problemen in de bloedvaten opgespoord worden. Het onderzoek gebeurt staand of liggend. Dit hangt af van welke bloedvaten de arts wil onderzoeken.

De vaatlaborant beweegt een apparaatje (de transducer) over uw huid. Hiermee beoordeelt de vaatlaborant de bloedvaten. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Er zijn verschillende vormen van een duplexonderzoek:

- Duplexonderzoek van de bloedvaten in de arm  
(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/duplexonderzoek-van-de-bloedvaten-de-arm>)
- Duplexonderzoek van de bloedvaten in het been  
(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/duplexonderzoek-van-de-bloedvaten-de-benen-femoro-popliteaal>)
- Duplexonderzoek van de bloedvaten in de benen (veneuze insufficiëntie/spataderen)  
(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/duplexonderzoek-van-de-bloedvaten-de-benen-veneuze-insufficiëntiespataderen>)
- Duplexonderzoek van de bloedvaten in de buik  
(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/duplexonderzoek-van-de-bloedvaten-de-buik-aorta-illacaal>)

- Duplexonderzoek van de bloedvaten in de hals  
(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/duplexonderzoek-van-de-bloedvaten-de-hals>)

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/duplexonderzoek>

## Behandelingen

De behandeling van een open been bestaat uit compressietherapie en een goede behandeling van de wond.

Om de wond goed te laten genezen is regelmatige controle nodig. Soms is aanvullend vaatonderzoek nodig. Bij een stoornis in de functie van de aders wordt de behandeling gestart met ambulante compressietherapie of zwachtelen. Bij compressietherapie wordt met verbanden of een verbandkous van buitenaf druk uitgeoefend op het been. Hierdoor verbetert de bloedafvoer richting het hart en verdwijnt de vochtophoping (oedeem). Als er geen vochtophoping meer in het been is, worden er elastische steunkousen aangemeten.

Het is heel belangrijk voor uw herstel dat u:

- veel beweegt (lopen, fietsen) om het vocht uit uw been te krijgen;
- oefeningen doet voor de kuitspieren;
- in rust de benen omhoog legt.

## Poliklinieken en afdelingen

### Dermatologie

Het specialisme Dermatologie houdt zich bezig met aandoeningen van de huid, de nagels, het haar en soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen).

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/dermatologie>

### Vaatchirurgie

Vaatchirurgen behandelen patiënten met vaataandoeningen, zoals een vaatvernauwing of juist een aneurysma (verwijding van het bloedvat).

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/vaatchirurgie>

Code DER-723