

Aandoening

Strekpeesletsel

Bij strekpeesletsel zijn één of meerdere strekpezen van de hand en/of vingers doorgesneden.

Strekpeesletsel wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een scherpe verwonding. De verwonding kan ontstaan door bijvoorbeeld een mes of glasscherf. Streckpeesletsel kan ook veroorzaakt worden door een zaagverwonding. Als er sprake is van strekpeesletsel, kunt u uw vingers of duim onvoldoende strekken.

Onderzoeken

We stellen de diagnose aan de hand van uw klachten en een lichamelijk onderzoek.

Behandelingen

Strekpeesletsel behandelen we met een operatie. Hierbij hecht de plastisch chirurg de uiteinden van de twee strekpezen aan elkaar.

Strekpeesoperatie

Bij een strekpeesletsel hecht de plastisch chirurg de beide strekpeesuiteinden aan elkaar met sterk hechtmateriaal.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/strekpeesoperatie>

Poliklinieken en afdelingen

Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen voeren operaties uit om de vorm of de functie van een lichaamsdeel te herstellen.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/plastische-chirurgie>

LIJV handencentrum

Het LIJV handencentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gespecialiseerd in hand- en polschirurgie. Patiënten met ingewikkelde hand- en polsproblemen kunnen hier terecht.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/lijv-handencentrum>

Code PCH-731