

MS & grieprik

Als u MS heeft kunt u de grieprik halen.

In het algemeen zijn mensen met MS niet gevoeliger voor het griepvirus (influenza) dan andere mensen. Het is ook niet extra gevaarlijk, tenzij u ernstige beperkingen heeft (bijvoorbeeld als u rolstoelgebonden bent).

De vaccinatie tegen seizoensgriep (grieprik) is goed onderzocht. Het wordt goed verdragen en veroorzaakt geen MS-aanvallen (schub/exacerbatie) of nieuwe activiteiten op de MRI. Een doorgemaakte griep met hoge koorts kan verergering geven van bestaande MS-klachten (pseudoschub) en weinig frequent kan een doorgemaakte griep met hoge koorts leiden tot een MS schub.

Moet ik een grieprik halen?

Voor een grieprik geldt bij MS geen standaardadvies. Als u door MS ernstige beperkingen heeft (bijvoorbeeld wanneer u rolstoelgebonden bent), adviseren wij u om een grieprik sterk te overwegen. De uiteindelijke keuze ligt bij u zelf.

Heeft u nog vragen over de griepvaccinatie, neem dan contact op met de MS-verpleegkundige.

Als u besluit zich te laten vaccineren tegen de griep, gelden per medicijn(groep) de volgende adviezen:

Interferon-beta (Avonex®, Betaferon®, Rebif®, Plegridy®) en glatirameer-acetaat (Copaxone®, Mylan®)

Vaccinatie zodra mogelijk.

Teriflunomide (Aubagio®) en dimethylfumaraat (Tecfidera®)

Vaccinatie zodra mogelijk.

Fingolimod (Gilenya®), ozanimod (Zeposia®), ponesimod (Ponvory®), siponimod (Mayzent®)

Vaccinatie bij voorkeur 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of zodra mogelijk als u dit medicijn al gebruikt.

Natalizumab (Tysabri®)

Vaccinatie zodra mogelijk.

Ocrelizumab (Ocrevus®), ofatumumab (Kesimpta®)

- Ocrelizumab: vaccinatie bij voorkeur 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of 3 tot 5 maanden na de laatste gift, als u al gestart bent met de behandeling.
- Ofatumumab: vaccinatie bij voorkeur 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of zodra mogelijk als u dit medicijn al gebruikt.

Cladribine (Mavenclad®)

Vaccinatie bij voorkeur 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of zodra mogelijk als u dit medicijn al gebruikt.

Alemtuzumab (Lemtrada®)

Vaccinatie bij voorkeur 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of 6 maanden na de laatste gift, als u al gestart bent met de behandeling.

Methylprednisolon stootkuur

Vaccinatie bij voorkeur minimaal 3 tot 5 dagen na de laatste gift.

Stamcelbehandeling

Vaccinatie bij voorkeur 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of 3 maanden daarna.

Code NEU-332