

MS & griep prik

Als u MS heeft kunt u de griep prik halen.

In het algemeen zijn mensen met MS niet gevoeliger voor het griepvirus (influenza) dan andere mensen. Het is ook niet extra gevaarlijk, tenzij u ernstige beperkingen heeft (bijvoorbeeld als u rolstoelgebonden bent).

De vaccinatie tegen seizoensgriep (griep prik) is goed onderzocht. Het wordt goed verdragen en veroorzaakt geen MS-aanvallen (schub/exacerbatie) of nieuwe activiteiten op de MRI. Een doorgemaakte griep met hoge koorts kan verergering geven van bestaande MS-klachten (pseudoschub) en weinig frequent kan een doorgemaakte griep met hoge koorts leiden tot een MS schub.

U kunt zonder problemen een griep prik krijgen als u interferonen, glatirameeracetaat, natalizumab en de orale middelen teriflunomide, dimethylfumaraat of fingolimod gebruikt.

Wanneer géén griep prik?

Griepvaccinatie wordt afgeraden in de eerste 6 weken voor of na een gift met ocrelizumab. Bij alemtuzumab of cladribine is dit nog langer.

Moet ik een griep prik halen?

Voor een griep prik geldt bij MS geen standaardadvies. Als u door MS ernstige beperkingen heeft (bijvoorbeeld wanneer u rolstoelgebonden bent), adviseren wij u om een griep prik sterk te overwegen. De uiteindelijke keuze ligt bij u zelf.

Als u nog vragen heeft over de griepvaccinatie, neem dan contact op met de MS-verpleegkundige.

Code NEU-332