

Behandeling

Anti-hormonale therapie leuproreline bij borstkanker

Uw arts schrijft leuproreline voor samen met tamoxifen, als aanvullende behandeling na een operatie van hormoongevoelige borstkanker (adjuvante behandeling).

U heeft samen met uw arts besloten dat u wordt behandeld met endocriene therapie in tabletvorm, tamoxifen. Hierbij krijgt u ook endocriene therapie in de vorm van injecties, leuproreline. De arts schrijft leuproreline voor bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn (premenopauzaal). Het zorgt ervoor dat de oestrogeenproductie in de eierstokken tijdelijk wordt stilgelegd.

De arts kan leuproreline ook voorschrijven aan premenopauzale vrouwen tijdens de behandeling met chemotherapie. Dit om de functie van de eierstokken tijdens chemotherapie te beschermen met mogelijk een grotere kans op het behouden van de vruchtbaarheid.

(073) 553 82 25

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Hoe gebruikt u leuproreline?

U krijgt van uw huisarts of specialist 1 keer per 4 weken of 1 x per 3 maanden een injectie onder de huid. Uw arts of verpleegkundig specialist bespreekt dit met u.

Geneesmiddelen en milieu

- Bestel niet meer medicijnen dan u denkt nodig te hebben.
- Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
- Lever oude medicijnen in bij de apotheek als u ze niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Betrouwbare informatie over medicijnen nodig?

Kijk hiervoor op www.apotheek.nl (<https://www.apotheek.nl>)

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen leest u in de folder 'Bijwerkingen bij anti-hormonale therapie'.

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/bijwerkingen-bij-anti-hormonale-therapie>)

- Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen,

hoofdpijn, gewichtstoename, huid- en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.

- Onvruchtbaarheid.
- Gewrichtsklachten.
- Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
- Misselijkheid.
- Trombose en hart- en vaatziekten.

Wat moet u weten tijdens het gebruik van leuproreline?

Meestal wordt leuproreline goed verdragen.

- Tijdens de eerste 2 maanden van de behandeling is het belangrijk dat u extra maatregelen neemt om een zwangerschap te voorkomen.
- Op de plaats waar u de injectie krijgt kan soms een blauwe plek ontstaan.
- Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
- Zeker in het begin van de behandeling, hebben sommige vrouwen klachten die ze ook kunnen hebben vlak voor hun normale menstruatie. Meestal gaat dit over als u doorgaat met de behandeling.
- Uw borsten kunnen pijnlijk zijn of gespannen aanvoelen.
- Er kan een verandering ontstaan van uw bloeddruk.
- U kunt last hebben van tintelende vingers of tenen.

Afspraken

Krijgt u last krijgt van bijwerkingen (behalve klachten die wijzen op trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken af te wachten, als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na een tijdje weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de last die u van bijwerkingen heeft kunt verminderen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren? Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoon nummer **(073) 553 82 25**.

- Met medische vragen en/of zorgproblemen vragen we u als het kan te bellen van maandag t/m vrijdag tussen **09.00 - 10.30 uur**. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
- Met spoedvragen kunt u bellen tot 17.00 uur.

Spoedvragen buiten kantooruren

Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum>)

Borstcentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/borstcentrum>)

