

Behandeling

# Anti-hormonale therapie met gosereline bij borstkanker

De arts schrijft goselerine voor bij vrouwen die niet in de overgang zijn (premenopauzaal).

Omdat de borstkanker hormoongevoelig is, wordt u behandeld met endocriene therapie in tabletvorm. Hierbij krijgt u ook endocriene therapie in de vorm van injecties, goselerine. Goselerine zorgt ervoor dat de eierstokken tijdelijk geen oestrogeen aanmaken. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden.

**(073) 553 82 25.**

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

## Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

## Hoe gebruikt u gosereline?

U krijgt van uw huisarts of verpleegkundig specialist 1 keer per 4 weken of 1 keer per 3 maanden een injectie onder de huid.

### Geneesmiddelen en milieu

- Bestel niet meer medicijnen dan u denkt nodig te hebben.
- Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
- Lever oude medicijnen in bij de apotheek als u ze niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

### Betrouwbare informatie over medicijnen nodig?

Kijk hiervoor op [www.apotheek.nl](https://www.apotheek.nl) (<https://www.apotheek.nl>)

## Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen leest u in de folder 'Bijwerkingen bij anti-hormonale therapie'.

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/bijwerkingen-bij-anti-hormonale-therapie>)

- Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid- en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
- Onvruchtbaarheid.
- Gewrichtsklachten.
- Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
- Misselijkheid.

- Trombose en hart-en vaatziekten.

## Wat moet u weten tijdens het gebruik van goselerine?

Meestal wordt goselerine goed verdragen.

- Tijdens de eerste 2 maanden van de behandeling is het belangrijk dat u nog extra maatregelen neemt om een zwangerschap te voorkomen.
- Op de plaats waar u de injectie krijgt, kan soms een blauwe plek ontstaan.
- Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
- Zeker in het begin van de behandeling, hebben sommige vrouwen klachten die ze ook kunnen hebben vlak voor hun normale menstruatie. Meestal gaat dit over als u doorgaat met de behandeling.
- Uw borsten kunnen pijnlijk zijn of gespannen aanvoelen.
- Er kan een verandering ontstaan van uw bloeddruk.
- U kunt last hebben van tintelende vingers of tenen.

## Afspraken

Krijgt u last van bijwerkingen (uitgezonderd klachten die horen bij trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken af te wachten. Vaak verdwijnen de klachten na een tijdje weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen u tips geven over hoe u de last, die u van bijwerkingen heeft, kunt verminderen.

## Heeft u nog vragen?

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren? Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer **(073) 553 82 25**.

- Met medische vragen en/of zorgproblemen vragen we u als het kan te bellen van maandag t/m vrijdag tussen **09.00 - 10.30 uur**. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
- Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen

## Spoedvragen buiten kantooruren

Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

## Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum>)

Borstcentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/borstcentrum>)

Code ONC-216