

Behandeling

MGUS, wanneer controle door huisarts

Wanneer MGUS 6 maanden stabiel is geweest wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Bij u is het M-proteïne na 6 maanden stabiel gebleven en niet gestegen. Daarmee is het risico dat uw MGUS (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aandoeningen/mgus>) overgaat in een kwaadaardige plasmacelziekte zo klein, dat er geen verdere controle door de arts of verpleegkundig specialist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis noodzakelijk is.

Uw huisarts ontvangt een brief met de bevindingen en uitslagen.

Controle door huisarts bij MGUS

Wanneer is controle door de huisarts nodig?

Laat het M-proteïne controleren via uw huisarts als u klachten heeft zoals:

- Bloedarmoede.
- Botpijnen.
- Botbreuken zonder dat u bent gevallen.
- Terugkerende infecties die niet te verklaren zijn.
- Neuropathie, zoals een doof gevoel in de armen/handen of benen/voeten, prikkelingen, tintelingen, pijn bij aanraken, evenwichtsstoornissen en een veranderend gevoel.
- Steeds meer vocht vasthouden.
- Een zeer lage bloeddruk en duizelingen.
- Een aanhoudend vol gevoel in de linker bovenbuik.
- Aanhoudende onverklaarde benauwdheid.
- Aanhoudende schuimende urine.
- Diarree, langer dan 4 weken.
- Carpale tunnelsyndroom.
- Ongewild afvallen.
- Nachtzweeten, drijfnat, meerdere keren per week en een paar weken achter elkaar.
- Vergrote lymfeklieren die niet weggaan.

Betrokken afdelingen

Hematologie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/hematologie>)

