

Behandeling

PTCP (SC) kuren bij borstkanker

Paclitaxel/Carboplatine/Trastuzumab/Pertuzumab (SC, Phesco®)

Uw arts heeft u voorgesteld om u neo-adjuvant (voor de operatie) te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) en doelgerichte middelen.

Cytostatica wordt ook wel chemotherapie genoemd. De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit 2 verschillende middelen chemotherapie: Carboplatine en Paclitaxel. Daarnaast krijgt u verschillende middelen doelgerichte therapie gericht tegen het HER2-eiwit: Trastuzumab en Pertuzumab. U krijgt deze medicijnen via het infuus toegediend. Een kuur duurt 3 weken (21 dagen) waarbij u op dag 1 en 8 medicijnen krijgt toegediend. U krijgt in totaal 9 kuren. Na deze behandeling wordt u geopereerd en na de operatie krijgt u nog een nabehandeling met medicijnen via het infuus. Welke medicijnen dat zijn en hoe vaak ze gegeven worden hangt af van de uitslag van het weefselonderzoek na de operatie.

Bekijk de folder

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2024-05/kuu-258-mammacarcinoom-ptcp-sc-phesco-pacl-carbo-trast-pert.pdf>)

Code KUU-258