

Behandeling

Sclerotherapie bij Morel-Lavallée

De specialist heeft met u gesproken over sclerotherapie voor de behandeling van Morel-Lavallée. Hierbij behandelen we een cyste (holte gevuld met vocht) met behulp van echografie.

U kunt hier lezen wat u kunt verwachten van de behandeling en als u weer thuis bent. Lees deze informatie goed door, dan bent u goed voorbereid op de behandeling.

Bij deze behandeling verwijderen we het vocht uit de cyste via een naald en u krijgt via de naald een medicijn toegediend om te voorkomen dat de holte zich opnieuw met vocht vult. U krijgt een plaatselijke verdoving.

Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier beschreven. De artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die u begeleiden, geven u specifieke informatie over uw situatie. Deze schriftelijke informatie is alleen bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie en als naslagwerk.

Wij raden u aan om altijd iemand mee te nemen naar de gesprekken met een zorgverlener.

(073) 553 26 00

maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Vorbereiding

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn? Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Vraag uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Meld dit óók altijd aan de laborant, voordat het onderzoek begint.

Nuchter zijn

U moet 2 uur voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u de laatste 2 uur voor het onderzoek niets meer mag eten of drinken.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Gebruikt u medicijnen?

Uw medicijnen kunt u gewoon innemen met een klein beetje water.

Heeft u diabetes?

Bent u diabetespatiënt, dan mag u 's morgens vroeg een lichte maaltijd gebruiken en uw medicijnen innemen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De radioloog brengt via de huid een naald in de cyste. Met behulp van echografie (geluidsgolven) brengt de radioloog de naald op de juiste plek. Via de naald wordt het vocht weggehaald. Er wordt bekeken hoeveel milliliter vocht uit de cyste komt. Het behandelen (scleroseren) van de cyste gebeurt met doxycycline. Dit medicijn prikkelt de binnenwand van de cyste. Door de holte van binnenuit te behandelen is het de bedoeling dat deze zich niet meer gaat vullen.

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Drukverband

Direct na de ingreep krijgt u een strak drukverband zodat de cyste geen ruimte krijgt om zich weer te vullen.

Leefregels na de behandeling

- Het drukverband moet u 2 weken blijven dragen.
- Het wondje (prikgaatje in de huid) kunt u laten drogen aan de lucht als de hechtpleister er af is.
- U mag na de behandeling het behandelde lichaamsdeel gewoon bewegen en gebruiken.
- U mag na de behandeling meteen weer eten en drinken.
- U mag na 24 uur weer douchen.
- Wanneer u weer kunt werken hangt af van het soort werk dat u doet en uw individuele situatie. Overleg met uw behandelend arts en uw bedrijfsarts wanneer u weer kunt gaan werken.

Risico's

Geen enkele ingreep is zonder risico's. Wij nemen maatregelen rondom de ingreep doen wij er alles aan om de risico's zo beperkt mogelijk te houden. Ondanks alle voorzorgmaatregelen, is er een kans dat er na de injectie symptomen optreden als een licht branderig gevoel, meer vochtophoping en warmer gevoel op de plek van de behandeling. Soms voelen patiënten zich licht koortsig op de dag na de behandeling.

Meestal is het behandelde gebied nog steeds verhard tijdens de controle-afspraak na 2 weken en merkt u dat de symptomen na een tijdje minder worden. De symptomen zijn meestal verdwenen na 6 tot 8 weken.

Contact opnemen bij klachten na ontslag

Krijgt u thuis last van ernstige pijn, zwelling, benauwdheid of krijgt u koorts, neem dan direct contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt de behandeling?

De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Komt u voor bloedprikken? Neem dan mee een geldig identiteitsbewijs, het aanvraagformulier of barcode die u heeft ontvangen (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee-als-u-komt-voor-bloedprikken>).

Komt u voor röntgenfoto's of een echografie? Neem dan mee een geldig identiteitsbewijs, en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee>).

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aanmelden>) hoe dit werkt.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen>) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code RAD-106