

Behandelschema: AC/Docetaxel /Trastuzumab/Pertuzumab (SC, Phesco®) kuren bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u vóór de operatie te gaan behandelen met chemotherapie en doelgerichte therapie. Doel van deze behandeling is om de tumor in de borst kleiner te maken en om terugkeer van de ziekte te voorkomen.

De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit 5 middelen;

Doxorubicine/Cyclofosfamide/Docetaxel/Trastuzumab en Pertuzumab.

Doxorubicine, Cyclofosfamide en Docetaxel vallen onder chemotherapie. Deze middelen remmen de celdeling met als doel kankercellen te vernietigen.

Trastuzumab en Pertuzumab vallen onder de doelgerichte middelen. Bij sommige vormen van borstkanker zijn de tumorcellen overgevoelig voor bepaalde groeifactoren. Bij u is gebleken dat de tumor HER2 receptor positief is. Dit betekent dat er veel HER2 receptoren aanwezig zijn op de kankercellen. Dit leidt tot versnelde tumorgroei. De middelen Trastuzumab en Pertuzumab blokkeren dit ongunstige effect van de HER2 receptoren.

De behandeling wordt in drie delen gegeven.

U start met Doxorubicine en Cyclofosfamide, ook wel AC behandeling genoemd. Deze wordt 1 keer per drie weken gegeven. In totaal krijgt u vier AC behandelingen.

Drie weken na de AC behandeling gaat u starten met Docetaxel-Trastuzumab-Pertuzumab. Deze behandeling wordt 1 keer per drie weken gegeven. In het totaal krijgt u vier van deze behandelingen.

Na deze behandeling zal de operatie gepland worden.

Het laatste onderdeel zal na de operatie starten. Deze behandeling bestaat uit Trastuzumab eenmaal per drie weken. In totaal 13 maal. Alle behandelingen kunnen poliklinisch gegeven worden.

Het verloop van de AC behandeling (Deel 1)

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Cyclofosfamide	dag 1
Doxorubicine	dag 1

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Dexamethason 8mg	dag 1, 1uur vóór de start van de behandeling innemen
Akynzeo 300/0.5mg	dag 1, 1 uur vóór de start van de behandeling innemen
Metoclopramide 10 mg	zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

Deze behandeling duurt ongeveer 2 uur.

Het verloop van de Docetaxel, Pertuzumab en Trastuzumab kuur (Deel 2)

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Docetaxel	dag 1
-----------	-------

2. Medicijnen die u via een gecombineerde onderhuidse injectie krijgt:

Trastuzumab	dag 1
Pertuzumab	dag 1

3. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Dexamethason 8mg:	dag 0 + 1 + 2, 2x daags (niet op lege maag innemen) Let op! dag 1, één uur voor start van de behandeling 8mg innemen. In de avond (niet te laat i.v.m. slecht slapen) nogmaals 8mg innemen
Granisetron 2mg:	dag 1, één uur voor start van de behandeling

Metoclopramide 10 mg: zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt ongeveer 2 uur.

Het verloop van de Trastuzumab kuur (Deel 3)

1. Medicijnen die u via het infuus of een onderhuidse injectie krijgt:
Trastuzumab dag 1
2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:
Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt ongeveer 1 uur (infuus) of 30 minuten (injectie).

Controles

Controle van uw bloed en bezoek aan arts of verpleegkundig specialist:

Deel 1 en deel 2 vóór start volgende kuur

Deel 3 vóór kuur 4, 7, 10 en 13

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode onvoldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid de kuur één week uit te stellen.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van ontlastingspatroon

Specifieke aandachtspunten AC kuur (Deel 1)

- op de eerste dag kan de urine rood gekleurd zijn van de medicijnen
- bij deze behandeling begint uw haar \pm 3 weken na de eerste kuur uit te vallen
- Bij deze behandeling is het mogelijk om hoofdhuidkoeling toe te passen om haaruitval te voorkomen/beperken. Uw verpleegkundig specialist zal u hier meer informatie over geven.
- ontstekingen van het mondslijmvlies is een veel voorkomende klacht bij deze behandeling
- tijdens de gehele behandeling met cyclofosfamide (deel 1) en docetaxel (deel 2) mag u geen grapefruit of kruisingen van grapefruit met een andere citrusvrucht (Sevilla sinaasappelen, mineola, pompelmoes gebruiken. Deze producten kunnen namelijk de werking van Cyclofosfamide en Docetaxel beïnvloeden.
- Cyclofosfamide kan (ernstige) beschadiging van de blaaswand veroorzaken. U wordt geadviseerd om minstens +/- 2 liter per dag te drinken (verduunningseffect). Ook wordt u geadviseerd om de urine niet te lang op te houden, maar te gaan plassen zodra u aandrang voelt. Indien u klachten ervaart, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

- de chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.
 - Cyclofosfamide: 3 dagen
 - Doxorubicine: 6 dagen

Specifieke aandachtspunten Docetaxel (Deel 2)

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens toediening Docetaxel. U begint de dag vóór de toediening van Docetaxel met het innemen van medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst, koorts.
- spierpijn/gewrichtspijn: dit kan optreden 2-3 dagen na de infusie en verdwijnt weer na 3-4 dagen. De pijn kan met Paracetamol 500 mg bestreden worden.
- perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.
- nagelafwijkingen kunnen voorkomen; de groei kan vertraagd worden, de nagels kunnen ook brozer worden waardoor ze eerder splijten, breken of loslaten. Daarnaast kunnen witte lijnen voorkomen. De veranderingen verdwijnen meestal langzaam na beëindiging van de behandeling.
- ook Docetaxel geeft haaruitval. Pas na het beëindigen van de behandeling met Docetaxel zal de haargroei weer op gang komen
- ook bij dit deel is het mogelijk om de hoofdhuidkoeling door te zetten indien u voldoende resultaat heeft bij de AC-kuren.
- Docetaxel blijft 4 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

Specifieke aandachtspunten Trastuzumab (Deel 2 en 3) en Pertuzumab (Deel 2)

- soms kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. Dit houdt in: ademhalingsmoeilijkheden, een lage bloeddruk en een snelle hartslag. Hiervoor worden voor het infuus op controles van pols en bloeddruk gedaan.
- er kan een griepachtig gevoel, rillerigheid en koorts optreden, gebruik zonodig Paracetamol 500 mg
- huiduitslag, jeuk, droge huid, acne, uitslag met vlekken en knobbeltjes kunnen voorkomen
- Trastuzumab en Pertuzumab kunnen invloed hebben op de werking van uw hartspier, u krijgt daarom regelmatig een hartfunctieonderzoek en uw bloeddruk en hartslag worden gecontroleerd.
- diarree kan voorkomen
- vermoeidheid en/of duizeligheid
- de meeste bijwerkingen treden op bij de eerste infusie.
- roodheid, vlekken, pijn en zwelling op de injectieplaats kunnen voorkomen
- door de toedieningsmethode (onder de huid in plaats van in de bloedvaten) kunnen er andere bijwerkingen optreden. U dient deze bijwerkingen altijd te melden aan uw arts en/of verpleegkundig specialist.
- indien u nog andere medicatie gebruikt die onder de huid geïnjecteerd dient te worden, mag dit niet in het bovenbeen, waar de trastuzumab/pertuzumab al wordt geïnjecteerd
- Trastuzumab en Pertuzumab blijven nog vele weken in het lichaam aanwezig. U moet uw arts en apotheker dan ook vertellen dat u Trastuzumab/Pertuzumab heeft gebruikt, als u in de

eerste 6 maanden na het stoppen van Trastuzumab/Pertuzumab een ander geneesmiddel voorgeschreven krijgt. Tevens dient u alle bijwerkingen in deze periode nog te melden aan uw behandelend arts.

Specifieke aandachtspunten dexamethason

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen