

## Behandelschema: Avelumab bij blaaskanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met immunotherapie. De behandeling bestaat uit het middel Avelumab. Immunotherapie is een behandeling met medicijnen die het eigen afweersysteem activeert en versterkt. Hierdoor kan het eigen afweersysteem de kankercellen beter herkennen en doden.

De behandeling die u krijgt, heet Avelumab en wordt eenmaal per 2 weken gegeven. Uw behandelend arts blijft Avelumab toedienen zolang u er baat bij heeft en de behandeling goed verdraagt. De behandeling kan poliklinische gegeven worden.

### Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via een infuus krijgt.  
Avelumab: dag 1
2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:  
Paracetamol 1 gram dag 1, 1 uur voor het infuus innemen  
Clemastine 1 mg: dag 1, 1 uur voor het infuus innemen (dit medicijn is om een allergische reactie te voorkomen.  
Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt ongeveer 1,5 uur

### Controles

Controle bloed: vóór de start van de nieuwe behandeling

Controle arts of verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe behandeling

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de behandeling een week wordt uitgesteld.

### Algemene bijwerkingen

- Verandering van de huid
- Verandering ademhalingsstelsel
- Invloed op het plassen (urineren) en de nieren
- Invloed op het hormoonstelsel
- Invloed op de darmen/ontlasting
- Invloed op ogen/zien
- Verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- Vermoeidheid
- Invloed op vruchtbaarheid en seksualiteit

### Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens de toediening Avelumab. Reacties kunnen zijn: koude rillingen, opvlieger gevoel, flushing, druk op de borst, stekende pijn in de onderrug, piepende ademhaling, benauwdheid, opzwellen van het gezicht, koorts, huiduitslag, maagdarmklachten, verhoogde of verlaagde bloeddruk.
- U neemt het middel Clemastine 1 uur voor de behandeling. Van dit middel kunt u slaperig worden, daarom wordt afgeraden om binnen 24 uur na het innemen van dit medicijn te gaan autorijden.
- Bij klachten van hoesten, benauwdheid moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

- In zeldzame gevallen kan pijn op de borst optreden. Neem dan direct contact op met het ziekenhuis.
- Een verhoging van de bloeddruk komt vaak voor
- Door de behandeling kunt u vocht gaan vasthouden, ook wel oedeem genoemd. U kunt last krijgen van vochtophoping op plaatsen waar normaal niet of nauwelijks vocht aanwezig is, bijvoorbeeld rond de enkels of in het gezicht.
- Pijn in spieren, botten en gewrichten kan voorkomen
- Neuropathie, dit is een stoornis aan de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of “doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek.
- Neem bij klachten van hoofdpijn, stijfheid in de nek, duizeligheid, verwardheid, bewustzijnsverlies of spierzwakte direct contact op met het ziekenhuis.

