

Behandelschema: Doxorubicine liposomaal en Bevacizumab kuren

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) en een monoklonale antistof. Doxorubicine liposomaal is cytostatica, Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam dat specifiek de nieuwvorming van bloedvaten naar de tumor remt. Afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid wordt het aantal kuren bepaald.

De kuren worden eenmaal per vier weken gegeven. De toediening van deze behandeling vindt op de polikliniek plaats.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:
Doxorubicine liposomaal: dag 1
Bevacizumab: dag 1 en 15
Daarnaast moet u 1 uur vóór de toediening van de cytostatica op dag 1, medicijnen innemen om misselijkheid en braken te voorkomen.
2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:
Granisteron 2mg dag 1, 1 uur vóór de chemotherapie innemen.
Metoclopramide 10 mg dag 1 t/m 4 en 15 t/m 18 zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid

Dag 1 van de eerste behandeling duurt ongeveer 2 ½ uur, de behandelingen daarna op dag 1 duren ± 2 uur. Dag 15 (alleen Bevacizumab) duurt ongeveer een half uur.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur en indien nodig.

Controle arts: vóór start nieuwe kuur en indien nodig.

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur één week wordt uitgesteld.

Mogelijke bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval (zelden)
- invloed op de werking van het beenmerg
- invloed op menstruatie /vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid

Specifieke aandachtspunten doxorubicine liposomaal

- op de eerste dag kan de urine rood gekleurd zijn van de medicijnen
- allergische reactie tijdens het infuus (blozen, kortademigheid, drukkend gevoel op borst /in keel, stekende lage rugpijn, licht in het hoofd, hoofdpijn, rillerigheid, opgezwollen gezicht) Als u een

allergische reactie krijgt moet u dit direct melden aan de verpleegkundige, er zullen dan medicijnen via het infuus gegeven worden om de allergische reactie op te heffen.

- soms klachten van een onregelmatige hartslag of kortademigheid. Indien dit optreedt dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.
- hand-voet-syndroom, de meest voorkomende symptomen zijn: roodheid, jeuk, pijn of gevoeligheid, zwelling en schilferen of vervellen van de huid.

Adviezen om het hand-voet-syndroom te voorkomen en /of te beperken:

- dompel uw handen en/of voeten zo mogelijk in een bad met koud water
- neem in de zomer regelmatig een koel bad
- vermijd hete lange douches, neem korte lauwe douches
- vermijd direct zonlicht, verblijf zoveel mogelijk in de schaduw
- vermijd nauwzittend schoeisel of schoenen met hoge hakken
- vermijd het dragen van knellende kleding (geen strakke broeken, riemen, Bh's, handschoenen en sokken)
- vermijd het dragen van knellende ringen, armbanden, horloges etc.
- vermijd intensieve inspanningen die een trauma aan de handen of voeten kunnen veroorzaken (tuinieren, joggen)
- vermijd blootstelling van de huid aan zeer heet water (bijv. de afwas)
- smeer handen en voeten regelmatig in met crème (bijv. lanettencrème /bepanthene crème), om uitdrogen te voorkomen. Crème heeft als functie om vocht in de huid aan te brengen. Zalf kan u eventueel gebruiken als er bijvoorbeeld kloofjes zijn. Zalf legt namelijk een beschermlaagje aan.

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Bevacizumab

- een allergische reactie kan, tijdens of net na infusie optreden. Indien optredend, dan gebeurt dit voornamelijk tijdens eerste toediening.
- verhoogde bloeddruk kan optreden. Controle van bloeddruk en urine vindt plaats gedurende de behandeling met Bevacizumab.
- complicaties bij wondgenezing. Behandeling met Bevacizumab mag niet binnen 28 dagen na een ingrijpende operatie of totdat de wond geheel genezen is. Bij problemen met wondgenezing moet u altijd contact op nemen met het ziekenhuis.
- trombosevorming
- bloedingen (neus, tandvlees, vaginaal)
- darmperforatie en darmbloedingen (zeer zelden). Bij ernstige buikpijn dient u altijd direct contact op te nemen met het ziekenhuis.
- u dient voorzichtig te zijn met het gebruik van ontstekingsremmers zoals Acetylsalicylzuur (bijv. Aspirine®, Diclofenac, Brufen, Naprosyne etc.) omdat deze het maagslijmvlies kunnen aantasten en bloedingen kunnen veroorzaken.