

Behandelschema: Pembrolizumab – Carboplatin – Gemcitabine kuur bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) en immunotherapie. De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit Pembrolizumab, Carboplatin en Gemcitabine. Cytostatica wordt ook wel chemotherapie genoemd. De behandeling bestaat uit twee verschillende cytostatica: Carboplatine en Gemcitabine. Pembrolizumab is een immunotherapie: het doel van immunotherapie is het beter herkennen en doden van kankercellen door het eigen afweersysteem.

Een kuur duurt 3 weken (=21 dagen), waarbij u op dag 1 en 8 medicatie via het infuus krijgt toegediend. Uw arts bespreekt hoeveel behandelingen nodig zijn. De toediening van deze behandeling vindt op de polikliniek plaats.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via een infuus krijgt.

Pembrolizumab	dag 1
Gemcitabine	dag 1 en 8
Carboplatin	dag 1 en 8

2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:

Dexamethason 8 mg	dag 1 en 8 één uur voor start van de behandeling innemen
Granisetron 2 mg	dag 1 en 8 één uur voor start van de behandeling innemen
Metoclopramide 10 mg	zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De tijdsduur van de eerste toediening zal ongeveer 2,5 uur zijn, daarna zal het op dag 1 ongeveer 2 uur zijn en dag 8 is dit 1½ uur.

Controles

Controle van uw bloed: voor start nieuwe kuur

Controle van eiwit in urine: voor start nieuwe kuur

Controle bij de arts/ verpleegkundig specialist: voor start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen:

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslimvlies
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van ontlastingspatroon

Specifieke aandachtspunten:

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens de toediening van de medicijnen.
Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst,

stekende pijn in de onderrug en koorts. Indien u dit voelt tijdens het infuus meldt u dit direct bij de verpleegkundige.

- soms ontstaan griepachtige verschijnselen op dag van toediening (koorts, spierpijn, rillerig, algeheel malaise gevoel) hiervoor mag zo nodig Paracetamol 1000 mg genomen worden.
- de chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.
 - Carboplatin: 4 dagen
 - Gemcitabine: 2 dagen

Specifieke bijwerkingen Gemcitabine:

- Huiduitslag en jeuk

Specifieke bijwerkingen Carboplatin:

- Soms treden gehoorstoornissen op

Specifieke bijwerkingen Pembrolizumab:

- In zeldzame gevallen kan pijn op de borst optreden. Neem dan direct contact op met het ziekenhuis.
- Huiduitslag en jeuk
- Kortademigheid en hoesten
- Verminderde werking van de nieren
- Ontsteking van het oog/oogwit (zeldzaam)
- Verminderde werking van de schildklier
- Spierzwakte en spierpijn, pijn in botten en gewrichten. Hiervoor mag zo nodig Paracetamol 1000 mg genomen worden
- Neem bij klachten van kortademigheid, hoesten, hoofdpijn, stijfheid in de nek, duizeligheid, verwardheid, bewustzijnsverlies of spierzwakte direct contact op met het ziekenhuis.

Specifieke aandachtspunten dexamethason

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen