



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Nivolumab (Opdivo) – Ipilimumab (Yervoy)

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met immunotherapie. De geneesmiddelen die worden gebruikt zijn Nivolumab en Ipilimumab. Het zijn specifieke eiwitten met het doel uw immuunsysteem te stimuleren om kankercellen te doden.

U krijgt 2 keer per 6 weken immunotherapie via een infuus toegediend. U krijgt op de eerste dag beide middelen via een infuus toegediend en verblijft hiervoor ongeveer 2,5 uur in het ziekenhuis. Precies 3 weken later krijgt u alleen Nivolumab toegediend en verblijft u hiervoor ongeveer 1,5 uur op de dagbehandeling of verpleegafdeling. Een periode van 6 weken wordt één kuur genoemd.

In principe gaan de kuren door net zolang als deze werkzaam zijn en de bijwerkingen acceptabel zijn, met een maximum van 24 maanden.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines gaan niet samen met immunotherapie. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis medicatie veranderingen door te geven zodat deze in het elektronisch dossier kunnen worden verwerkt.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande [link](#) op de website van het JBZ.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/immuuntherapie.

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in rode uitslag van de huid (1-10%);
- Afname eetlust, misselijkheid, braken (>10%);
- Tumorpijn (1-10%);
- Huiduitslag (>10%);
- Schildklierfunctiestoornissen (1-10%);
- Leverfunctiestoornissen (1-10%);


Contact opnemen

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen

- Diarree/buikpijn (>10%);
- Hoesten (1-10%);
- Reactie op injectieplaats (>10%);
- Gewrichtspijn/stijfheid (1-10%);
- Vermoeidheid (>10%);
- Koorts (>10%).

Kuurschema



Dag 1 Nivolumab en Ipilimumab

Dag 22 Nivolumab

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Indien u last heeft van misselijkheid mag u tot maximaal 3 keer per dag een tablet Metoclopramide van 10 mg nemen.

Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt tijdens het tijdstip van de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur	4e dag na de kuur
Metoclopramide 10 mg (tablet)	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag