

Behandelschema: TCa kuren (Paclitaxel / Carboplatine) met Pembrolizumab

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) en immunotherapie. Het doel van de immuuntherapie is het beter herkennen en doden van kankercellen door het eigen afweersysteem.

De behandeling die u is voorgesteld heet T3Ca Pembrolizumab en bestaat uit twee verschillende stoffen chemotherapie: Paclitaxel en Carboplatine. En immunotherapie: Pembrolizumab.

U krijgt deze medicijnen via het infuus toegediend. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U krijgt in totaal 6 kuren. En vanaf kuur 7 gaat u door met alleen Pembrolizumab. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Paclitaxel: dag 1
Carboplatine: dag 1
Pembrolizumab dag 1

2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:

Dexamethason 8 mg dag 1, één uur voor start van de behandeling innemen
dag 2+3: in de ochtend
Granisetron 2 mg dag 1, één uur voor start van de behandeling innemen
Clemastine 2 mg dag 1, één uur voor start van de behandeling innemen
Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen
achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen
met uw behandelaar.

De totale behandeling duurt bij kuur 1: ± 4 uur, vanaf kuur 2: ± 3 ½ en vanaf kuur 7: ± 1 uur.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur

Controle bij uw arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de volgende kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen chemotherapie

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van ontlastingspatroon

Algemene bijwerkingen immunotherapie

- Huiduitslag en jeuk
- Kortademigheid en hoesten
- Verminderde nierfunctie
- Traagwerkende schildklier of uitval van andere hormoonstelsels
- Diarree

- Ontsteking van het oog / oogwit
- Gewrichtsontstekingen
- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust, misselijkheid / braken

Specifieke aandachtspunten

- In zeldzame gevallen kan pijn op de borst optreden. Neem dan direct contact op met het ziekenhuis.
- Als u tijdens het inlopen klachten krijgt van een opvlieger-gevoel, roodheid, warmte, druk op de borst, kortademigheid, stekende pijn in de onderrug of bij andere veranderingen moet u direct de verpleegkundige waarschuwen.
- Pijn in spieren, botten en gewrichten kan voorkomen, hiervoor mag u paracetamol innemen.
- Neem bij klachten van kortademigheid, hoesten, hoofdpijn, stijfheid in de nek, duizeligheid, verwardheid, bewustzijnsverlies of spierzwakte direct en bij overige klachten laagdrempelig contact op met het ziekenhuis.

Specifieke aandachtspunten

- overgevoelighedsreacties kunnen optreden tijdens de toediening van zowel Paclitaxel als Carboplatin. U neemt vooraf aan de toediening medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: blozen, opvlieger gevoel, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst, stekende pijn in de onderrug en koorts. Indien u deze klachten krijgt moet u ze direct aan de verpleegkundige melden.
- Vooraf neemt u Clemastine in. Van dit middel kunt u slaperig worden, daarom wordt afgeraden om binnen 24 uur na het infuus te gaan autorijden
- spierpijn, gewrichtspijn: dit kan optreden 2 à 3 dagen na het infuus en verdwijnt weer. Deze pijn kan bestreden worden met Paracetamol 500 mg.
- perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.
- bij deze behandeling begint uw haar ± 14 dagen na de eerste kuur uit te vallen.
- Het is bij deze behandeling mogelijk om hoofdhuidkoeling toe te passen. Bij 31% van de patiënten die bij wie tijdens deze kuur hoofdhuidkoeling werd toegepast was geen andere vorm van hoofdbedekking nodig. 69% van de patiënten waren ondanks hoofdhuidkoeling afhankelijk van een haarwerk/mutsjes/sjaals/etc. Indien u kiest voor hoofdhuidkoeling duurt de behandeling per keer 2 uur langer. De totale behandeling duurt dan ongeveer 7 uur.
- soms treden gehoorstoornissen op.
- de chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.
 - Paclitaxel: 2 dagen
 - Carboplatin: 4 dagen

Specifieke aandachtspunten immunotherapie

- In zeldzame gevallen kan pijn op de borst optreden. Neem dan direct contact op met het ziekenhuis.

- Als u tijdens het inlopen klachten krijgt van een opvlieger-gevoel, roodheid, warmte, druk op de borst, kortademigheid, stekende pijn in de onderrug of bij andere veranderingen moet u direct de verpleegkundige waarschuwen.
- Pijn in spieren, botten en gewrichten kan voorkomen, hiervoor mag u paracetamol innemen.
- Neem bij klachten van kortademigheid, hoesten, hoofdpijn, stijfheid in de nek, duizeligheid, verwardheid, bewustzijnsverlies of spierzwakte direct en bij overige klachten laagdrempelig contact op met het ziekenhuis.

Specifieke aandachtspunten dexamethason

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen