

Behandelschema Docetaxel/Prednison icm Abirateron kuren bij prostaatkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) in combinatie met een anti-hormonale behandeling. De chemotherapie die u is voorgesteld heet Docetaxel/Prednison, de anti-hormoontherapie heeft Abirateron. De chemokuur wordt eenmaal per drie weken gegeven. Hiervan krijgt u 6 kuren. Deze chemotherapie kan poliklinisch worden gegeven. De anti-hormonale therapie bestaat uit tabletten deze blijft u gebruiken zolang de werking goed is en de bijwerkingen acceptabel zijn.

Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Docetaxel: dag 1

Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus toegediend om misselijkheid en braken te voorkomen.

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Dexamethason 8 mg dag 0, 2x daags (niet op lege maag innemen)

Metoclopramide 10 mg dag 1 t/m 4, zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid

Abirateron (Zytiga®) 1000 mg 1x daags (2 tabletten van 500 mg)

Prednisolon 5 mg 1x daags 2 tabletten van 5mg

De behandeling duurt ± 1,5 uur. Indien u kiest voor hoofdhuidkoeling duurt de behandeling ± 2 uur.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur

Controle arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- invloed op de werking van het beenmerg
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid en nagels

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten chemotherapie

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens toediening Docetaxel. U begint één dag vóór de toediening van Docetaxel met het innemen van medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst, koorts.
- spierpijn/gewrichtspijn: dit kan optreden 2-3 dagen na de infusie en verdwijnt weer na 3-4 dagen. De pijn kan met Paracetamol 500 mg bestreden worden.

- neuropathie, dit is een stoornis aan de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of “doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgende polibezoek.
- nagelafwijkingen kunnen voorkomen; de groei kan vertraagd worden, de nagels kunnen ook brozer worden waardoor ze eerder splijten, breken of loslaten. Daarnaast kunnen witte lijnen voorkomen. De veranderingen verdwijnen meestal langzaam na beëindiging van de behandeling.
- Prednison kan de eetlust verhogen, soms wat vocht in het lichaam vasthouden. Soms hebben mensen ten gevolge van deze medicijnen wat moeite met inslapen
- bij deze behandeling begint uw haar \pm 3 weken na de eerste kuur uit te vallen
- bij deze behandeling is het mogelijk om hoofdhuidkoeling toe te passen om haaruitval te voorkomen/beperken. Uw verpleegkundige zal u hier meer informatie over geven.

Excreta

De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

- Docetaxel: 4 dagen

Gebruiksaanwijzing anti-hormoontherapie

- Tabletten in zijn geheel doorslikken met water.
- Neem de tabletten **minstens twee uur** na het eten of op nuchtere maag.
- Minimaal **één uur na het innemen** van dit geneesmiddel mag er geen voedsel worden gegeten.

Als u een dosis bent vergeten

- Als u vergeet om Abirateron of Prednison in te nemen, neem dan de volgende dag uw gebruikelijke dosis.
- Als u langer dan één dag bent vergeten om Abirateron of Prednison in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten anti-hormoontherapie

- hoge bloeddruk kan voorkomen tijdens het gebruik van Abirateron
- zwelling armen en benen door vochtophoping
- urineweginfectie
- bijnierproblemen (zelden)
- Prednison kan de eetlust verhogen, soms wat vocht in het lichaam vasthouden. Soms hebben mensen hebben ten gevolge van deze medicijnen wat moeite met inslapen. Neem de medicatie daarom 's ochtends in.
- in zeldzame gevallen kan pijn op de borst optreden. **Stop direct met inname Abirateron en neem direct contact op met het ziekenhuis** indien u last heeft van spierzwakte, spiertrekkingen of hartkloppingen.