

Behandelschema: Palbociclib en Letrozol bij lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Palbociclib en Letrozol.

Palbociclib is een geneesmiddel dat een specifiek eiwit remt binnen in de cel (intracellulair). Hierdoor wordt de celcyclus in borstkankercellen geremd. Tevens verhoogd het middel in combinatie met Letrozol de hormoongevoeligheid van borstkanker.

Letrozol is een geneesmiddel dat valt onder de endocriene therapie. Letrozol wordt voorgeschreven bij vrouwen die al in de overgang zijn (postmenopauzaal). Letrozol remt de aanmaak van oestrogeen. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden. Naast de kankercellen in de borst bereikt Letrozol ook eventuele kankercellen die in het bloed en/of de lymfbanen terecht zijn gekomen (om zich elders in het lichaam te nestelen).

Het verloop van de behandeling

Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Palbociclib 125 mg	1x daags 1 capsule (gedurende 3 weken daarna 1 week stop)
Letrozol 2,5mg	1x daags 1 tablet, continu

U kunt de Palbociclib alleen verkrijgen via de Jeroen Bosch Apotheek.

Gebruiksaanwijzing Palbociclib en Letrozol

- Neem de tabletten dagelijks in op een vast tijdstip.
- Neemt Palbociclib in met voedsel.
- Palbociclib capsules in zijn geheel innemen, niet op kauwen of fijn malen.
- Gebruik **geen Sint Janskruid** tijdens het gebruik van Palbociclib
- Tijdens de gehele behandeling met Palbociclib mag u **geen** grapefruit en grapefruitsap gebruiken. Deze producten kunnen namelijk de werking van de Palbociclib beïnvloeden.
- Bespreek elke verandering in uw geneesmiddelgebruik eerst met de behandelend arts/verpleegkundig specialist. Dit geldt ook voor homeopathische middelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist. Sommige middelen mogen namelijk niet in combinatie met de voorgestelde behandeling gebruikt worden.

Als u een dosis bent vergeten of hebt uitgebraakt

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist.
- indien u braakt na inname van de medicatie neem dan de medicatie niet opnieuw in. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist.

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats.

Specifieke aandachtspunten Palbociclib

- verminderde eetlust, smaakverandering, misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- huiduitslag
- vermoeidheid
- invloed op de werking van het beenmerg
- soms haarverlies (bij +/- 20% van de mensen), zelden volledige haaruitval

Specifieke aandachtspunten Letrozol

Over het algemeen wordt Letrozol goed verdragen. Enkele zaken die u moet weten tijdens het gebruik van Letrozol:

- Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
- Bij het gebruik van Letrozol is er een groter risico op botontkalking.
- 30 tot 40% van de vrouwen die behandeld worden met Letrozol heeft last van (soms ernstige) bot- en gewrichtsklachten.
- Bij uitgezaaide borstkanker moet u Letrozol minimaal drie maanden gebruiken om te kunnen beoordelen of het medicijn werkt.
- Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan na het starten van de Letrozol de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer verminderen. Dit betekent niet dat de behandeling niet aanslaat. Aanhoudende en toenemende pijn zijn echter wel redenen om contact op te nemen met uw arts of verpleegkundig specialist.
- Letrozol kan overgangsverschijnselen geven. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 3 van de informatiewijzer endocriene therapie.
- misselijkheid
- trombose en hart- en vaatziekten

Afspraken

Wanneer u last krijgt van bijwerkingen van de Letrozol (uitgezonderd klachten die duiden op trombose of een longembolie) is het raadzaam om deze wanneer dat mogelijk is eerst enkele dagen tot weken aan te kijken. Vaak verdwijnen de klachten na verloop van tijd weer als uw lichaam zich op de behandeling heeft ingesteld.

Bespreek de bijwerkingen die u ondervindt in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen u tips geven over hoe u de hinder die u van bijwerkingen ondervindt kan verminderen.

Bij vragen en /of onacceptabele bijwerkingen contact opnemen met het verpleegkundig spreekuur.