Behandelschema: Nivolumab bij Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met immuuntherapie. Immuuntherapie is een behandeling met medicijnen die het eigen afweersysteem activeert en versterkt. Hierdoor kan het eigen afweersysteem de kankercellen beter herkennen en doden.

De behandeling die u krijgt, heet nivolumab en wordt eenmaal per 2 weken gegeven. De behandeling gaat door zolang het werkzaam is of totdat de behandeling niet meer wordt verdragen. De behandeling kan poliklinisch gegeven worden.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:
   Nivolumab dag 1
2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:
   Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt ± 1 uur.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start volgende kuur
Controle arts/verpleegkundig specialist: vóór start volgende kuur
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur één week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- Verandering van de huid.
- Verandering ademhalingsstelsel.
- Invloed op het plassen (urineren) en de nieren.
- Invloed op het hormoonstelsel.
- Invloed op de darmen/ontlasting.
- Invloed op ogen/zien.
- Verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken.
- Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies.
- Vermoeidheid
- Invloed op vruchtbaarheid en seksualiteit.
- Emotionele veranderingen.

Specifieke aandachtspunten

- Tegen eventuele misselijkheid kunt u bij uw eigen apotheek of politheek medicijnen ophalen. Uw arts geeft hiervoor een recept mee.
- In zeldzame gevallen kan pijn op de borst optreden. Neem dan direct contact op met het ziekenhuis.
- Een verhoging van de bloeddruk komt vaak voor.
- Pijn in spieren, botten en gewrichten kan voorkomen.
- Neuropathie, dit is een stoornis aan de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of “doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek.
- Neem bij klachten van hoofdpijn, stijfheid in de nek, duizeligheid, verwardheid, bewustzijnsverlies of spierzwakte direct contact op met het ziekenhuis.