

## **Behandelschema: Trastuzumab (3 wekelijks)**

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een doelgerichte therapie. Het medicijn dat u krijgt, heet Trastuzumab. Het medicijn werkt gericht tegen het HER2-eiwit en behoort tot doelgerichte therapie. Trastuzumab kan als aanvullende behandeling of bij uitgezaaide borst-, maag of slokdarmkanker gegeven worden. Voor uitgezaaide kanker geldt dat afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid het aantal behandelingen wordt bepaald. De behandeling kan poliklinisch gegeven worden.

### **Het verloop van de kuur**

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:  
Trastuzumab: 1x per 3 weken

Duur van de 1<sup>e</sup> behandeling: ± 2 uur daarna ± 1 uur

### **Controles**

Controle van uw bloed: vóór start volgende kuur of op indicatie  
Controle arts/ verpleegkundig specialist: vóór start volgende kuur of op indicatie

### **Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten**

- soms kunnen overgevoelighedsreacties optreden. Dit houdt in: ademhalingsmoeilijkheden, een lage bloeddruk en een hoge hartslag.
- er kan een griepachtig gevoel, rillerigheid, koorts, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn optreden; hiervoor mag u zo nodig Paracetamol 500mg gebruiken
- huiduitslag, jeuk, droge huid, acne, uitslag met vlekken en knobbeltjes kunnen voorkomen
- Trastuzumab kan invloed hebben op de werking van uw hartspier, u krijgt daarom regelmatig hartfunctieonderzoek en uw bloeddruk en hartslag worden gecontroleerd
- Diarree kan voorkomen
- Vermoeidheid / duizeligheid
- Trastuzumab blijft nog vele weken in het lichaam aanwezig. U moet uw arts en apotheek dan ook vertellen dat u Trastuzumab heeft gebruikt, als u in de eerste 6 maanden na het stoppen van Trastuzumab een ander geneesmiddel voorgeschreven krijgt. Tevens dient u alle bijwerkingen in deze periode nog te melden aan uw verpleegkundig specialist of behandelend arts.

