



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Taxol® - Carboplatin - Bevacizumab

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middel) en doelgerichte therapie. Cytostatica zijn Taxol® (dit is hetzelfde als Paclitaxel) en Carboplatin. Bevacizumab is doelgerichte therapie.

U krijgt deze middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u gaat krijgen. Deze behandeling kan poliklinisch gegeven worden en duurt ongeveer 6 uur. Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze informatie.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/doelgerichte-therapie

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Overgevoelighedsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, beklemmend gevoel op de borst, bloeddrukdaling of stijging (> 10%);
- Haaruitval (>10%);
- Buikpijn (>10%);
- Kortademigheid (>10%);
- Verhoogd eiwit in de urine (>10%);
- Verstoring van de stoelgang (oa diarree) (> 10%);
- Gestoorte wondgenezing (> 10%);
- Droge huid, huiduitslag (> 10%);
- Spierpijn/Gewrichtspijn (1-10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten (1-10%);


Contact opnemen

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen

- Oorsuizen & gehoorverlies (1-10%);
- Nagelafwijkingen (1-10%);
- Slapeloosheid/opgewondenheid (1-10%);
- Verhoogde glucosespiegel (1-10%);
- Longembolie (1-10%);
- Neusbloeding, longbloeding, bloeding van de dikke darm (1-10%);
- Vermoeidheid en krachtsverlies (> 10%).

Kuurschema

1 	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Dag 1

Taxol® - Carboplatin -
Bevacizumab

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Op de achterzijde van dit formulier vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt mee te brengen naar het ziekenhuis.

Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur
Dexamethason 4 mg (tablet)	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	geen	geen
Metoclopramide 10 mg (tablet)	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 1 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag
Paracetamol 500 mg (tablet)	Bij spierpijn paracetamol 500-1000 mg per keer, zo nodig elk 6 uur			