

Behandelschema: Gemcitabine icm bestraling (chemoradiatie) voorafgaand aan de alvleesklierkanker operatie

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie Gemcitabine (celgroeiremmende middelen) in combinatie met radiotherapie (bestraling). De bestraling vindt in het Verbeeten Instituut plaats. Zij zijn verantwoordelijk voor dit onderdeel van de behandeling. Zij zullen u alle benodigde informatie met betrekking tot de bestraling verstrekken. De gehele behandeling kan poliklinisch gegeven worden en ziet er als volgt uit:

Kuur 1 en 3 : Gemcitabine dag 1 en 8, hierna een week rust.

Kuur 2 : Gemcitabine dag 1, 8 en 15 in combinatie met 3 weken radiotherapie (niet in het weekend), hierna een week rust.

Kuur 4 t/m 7: Gemcitabine dag 1, 8 en 15 hierna een week rust.
Na de laatste week rust volgt een evaluatie van de alvleesklierkanker dmv een CT scan van de buik en longen. Tussen de 3 en 6 weken na de chemotherapie volgt de operatie van de alvleesklier.

Behandelschema: Gemcitabine na alvleesklierkanker operatie

Nu de operatie van de alvleesklier is afgerond, willen wij u binnen 12 weken na de operatie nog aanvullend verder behandelen met Gemcitabine chemotherapie. Voorafgaand aan de operatie heeft u al chemotherapie in combinatie met bestraling gehad. Nu, na de operatie, is het behandelplan om u nog vier kuren Gemcitabine toe te dienen. Een kuur duurt vier weken en bestaat uit een infuus op dag 1, 8 en 15. Daarna heeft u één week rust. Deze kuur wordt poliklinisch gegeven.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Gemcitabine: dag 1, 8 (en 15)

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Pantoprazol 40 mg alleen cyclus 2 vanaf start t/m einde cyclus 2

Granisetron 2 mg dag 1,8 (en 15) 60 minuten voorafgaand aan de kuur innemen

Metoclopramide 10 mg dag 1-4, 8-11 (en 15-18), zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid

De behandeling met Gemcitabine duurt ± 1 uur.

Controles

Controle bloed: zo nodig wekelijks en vóór de start van de nieuwe kuur

Controle arts: vóór start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- Verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken (mn tijdens bestralingsweken)
- Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- Vermoeidheid (vaak)
- Invloed op de werking van het beenmerg
- Invloed op menstruatie/vruchtbaarheid

Jeroen Bosch Ziekenhuis/Oncologisch Centrum/ Pancreascarcinoom / voor en na operatie Gemcitabine icm radiotherapie/patiënteninformatie /juli 2024/Pagina 1 van 2/

- Invloed op seksualiteit
- Veranderingen van de huid
- Verandering van het ontlastingspatroon; diarree (vaak, mn tijdens bestralingsweken)

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- Vermoeidheid is een bijwerking die vaak voorkomt.
- Maagproblemen, zoals misselijkheid, braken, verminderde eetlust. Soms kan zich een maagzweer ontwikkelen. Preventief wordt er daarom een maagbeschermer gedurende 6 maanden voorgeschreven.
- Vaker ontlasting op een dag of diarree kan optreden.
- Soms wat griepachtige verschijnselen, hiervoor mag zo nodig Paracetamol genomen worden.
- Soms wat huiduitslag of jeuk